

**СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА B5A-DiCO – ANATOLIA-ry для ПОДКОРМКИ
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР.)**

diCO – B5A – ANATOLIA-ry

ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

(DiCO продукция была проанализирована на 05/09/2011 ссылкой 50H4104 ТУБИТАК (турецкий Научно-технологический научно-исследовательский центр) в докладе делается вывод ДДТ, трифлуралин, хлорпирифос, METHIELATION, DIFENOCOZAZOLE, как и наркотиков остается полностью устраняются при помощи DiCO. Как использовать DiCO на различные растения и растительность. Овощи (в теплицах;))

ОВОЩИ (В ТЕПЛИЦЕ)

После высаживания рассады через 10-15 дней осуществляют подкормку почвы из расчета 250 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенного минимум 25 л воды, на 10 соток. При последующей подкормке 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) разводят минимум 25 л воды и применяют с интервалом в 20 дней или же разделив 20 дневную дозу на 3 или 4 раза.

Рекомендуется вносить в почву продукт способом капельного орошения сразу же после применения удобрения.

(На открытых участках) После высаживания рассады через 10-15 дней осуществляют подкормку почвы из расчета 125 мл , (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) разведенного минимум 12,5 л воды, на 10 соток. Последующая подкормка производится с интервалом в 1 месяц три раза. Рекомендуется вносить продукт в почву сразу же после применения удобрения из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) , разведенных минимум 12.5 л воды, на 10 соток. Или же осуществлять листовую подкормку после внесения удобрения из расчета 125 мл , р(diCO-B5A-ANATOLIA-ry) азведенных минимум 25 л воды, на 10 соток.

КЛУБНИКА (НА ПОЛЕ)

При первом применении осенью необходимо внести в почву 125 мл удобрения diCO, разведенных минимум в 12,5 мл воды на 10 соток.

При втором применении весной необходимо внести в почву 125 мл удобрения diCO, разведенных минимум в 25мл воды на 10 соток.

Третья листовая подкормка осуществляется таким же образом из расчета 125 мл продукта на 10 соток.

КЛУБНИКА (В ТЕПЛИЦАХ)

Через 10-15 дней после высадки саженцев необходимо ввести в почву 500 мл diCO, разведенного в минимум 50 л воды на 10 соток. Последующее применение производится с интервалом в 20 дней или же 20-ти дневную дозу поделив на три или

четыре раза. Рекомендуется вводить в почву продукт сразу же после применения удобрения через капельную систему орошения.

КАРТОФЕЛЬ

Картофель: 125 мл продукта, разведенного минимум 12.5 л воды на десять соток вводят в почву после применения фосфорного удобрения.

В последующий раз в период развития клубня осуществляется листовая подкормка из расчета на 10 соток 200 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенного минимум 50 л воды, с интервалом в 30 дней. Подкормку осуществлять 2 раза.

Такая подкормка (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) рекомендуется после применения химического удобрения и лекарственных препаратов.

ДЫНЯ – АРБУЗ- БОБОВЫЕ

Дыня – Арбуз- Бобовые: Рекомендуется применять (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) при первом поливе после посадки растений перед тем, как засыпать землей лунку. Продукт применяется из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) разведенный минимум 12,5 л воды на 10 соток.

В период разветвления рекомендуется делать почвенную подкормку из расчета 125 мл , (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) разведенного минимум 25 л воды на 10 соток.

По желанию, в период плодообразования можно осуществить подкормку в утренние прохладные часы из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенного минимум 25 л воды на 10 соток.

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Перед посевом, после использования тройного суперфосфата осуществляется почвенная подкормка из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных 12.5 л воды на 10 соток. После этого осуществляется посев.

В период рыхления грунта (образование 2-4 листков) осуществляют листовую подкормку растения из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных минимум 25 л воды на 10 соток.

После образования плода осуществляют листовую подкормку из расчета 125(diCO-B5A-ANATOLIA-ry) мл , разведенных минимум 25 л воды на 10 соток.

ХЛОПОК

Хлопок: Перед посевом, после использования тройного суперфосфата осуществляется почвенная подкормка из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных минимум 12.5 л воды на 10 соток. После этого осуществляется посев.

В период рыхления грунта (образование 2-4 листков) после внесения удобрения и применения лекарственных препаратов осуществляют листовую подкормку растения из расчета 125 мл(diCO-B5A-ANATOLIA-ry) , разведенных минимум 25 л воды на 10 соток.

КУКУРУЗА

Одновременно с внесением тройного суперфосфата осуществляется почвенная подкормка из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных минимум 12.5 л воды на 10 соток.

После появления 4-8 листов, после осуществления второй подкормки удобрением применяют (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), из расчета 125 мл продукта на минимум 25 л воды на 10 соток.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Рекомендуется применять через 1 месяц после посева из расчета 125 мл продукта, разведенных минимум 25 л воды на 10 соток.

В период кущения после внесения весеннего удобрения осуществляют листовую подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных минимум 25 л воды, на 10 соток.

РИС

Рис: Вместе с внесением в почву тройного суперфосфата в апреле применяют продукт (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) из расчета 125 мл продукта, разведенных минимум 20 л воды, на 10 соток. Вторую подкормку осуществляют за 30 дней до сбора урожая, из расчета 125 мл продукта, разведенных минимум 20 л. воды.

ПОДСОЛНУХ

Осуществляют почвенную подкормку, продукт применяют совместно с тройным суперфосфатом из расчета 125 мл, разведенных минимум 12.5 л воды.

После появления на растении 4-8 листков, после вторичного внесения удобрения, рекомендуется осуществить ЛИСТОВУЮ - ПОЧВЕННУЮ подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных минимум 25 л воды, на 10 соток.

Желательно, через 30 дней осуществить третью подкормку продуктом (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) из расчета 125 мл на минимум 25 л воды на 10 соток.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛ Я ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ЯВЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ОВОЩАХ И ФРУКТАХ ЗА 10 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИСТОВУЮ ПОДКОРМКУ РАСТЕНИЙ ИЗ РАСЧЕТА 200 МЛ (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) НА МИНИМУМ 50 Л ВОДЫ НА 10 СОТОК.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ И САЖЕНЦЕВ

В добавок к нормальной программе подкормки химическим удобрением раз в 20 дней необходимо вносить в почву (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) из расчета 125 мл на минимум 25 л воды на 10 соток. Подкормку необходимо осуществлять до тех пор, пока рассада не будет продана. Возможно применение (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) 3 или 4 раза, при этом необходимо поделить 20-дневную дозу продукта (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) на 3 или 4 части. Желательно не прибегать к листовой подкормке.

При вынужденных же обстоятельствах необходимо увеличить в 3 или 4 раза количество воды.

ВСЕ ВИДЫ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Первая подкормка осуществляется осенью после внесения удобрения из расчета 125 мл на (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) минимум 12,5 л воды на 10 соток.

Рекомендуется применять продукт (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) два или три раза в сезон. Вторая подкормка, почвенная или же листовая, осуществляется сразу же после внесения весеннего удобрения из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) на минимум 25 л воды.

Третья подкормка, по желанию, осуществляется через листья после плодовой завязи из расчета 125 мл на минимум 25 л на 10 соток.

(ПО-НАРОДНОМУ, ПРИ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКЕ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ТОНУ ПРИХОДИТСЯ 1 КГ)

ИНЖИР

Подкормка осуществляется через почву в апреле-мае из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), разведенных 12.5 л воды, на 10 соток.

При вторичном применении, через месяц осуществляется листовая подкормка из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) на 25 л воды на 10 соток.

Третий раз подкормка осуществляется через 20 дней почву из расчета 125 мл diCO на 25 л воды на 10 соток.

Рекомендуется, чтобы перед применением (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) температура почвы и листвы была понижена. Подкормку осуществляют в прохладные ранние утренние часы.

ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО

Подкормку продуктом (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) осуществляют в январе из расчета 125 мл на минимум 12.5 л воды на 10 соток.

Вторую подкормку рекомендовано осуществлять через листья перед цветением из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) на минимум 25 л воды.

Последняя, листовая подкормка осуществляется по достижению плодов величины равной полсантиметрам, из расчета 125 мл diCO, разбавленного минимум 25 л воды, на 10 соток.

ФИСТАШКОВОЕ ДЕРЕВО

Первая, почвенная подкормка осуществляется после внесения осеннего удобрения из расчета 125 мл, разведенного минимум 12.5 л воды, на 10 соток.

Рекомендуется применять (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) три или четыре раза в сезон.

Вторичное применение осуществляется сразу же после внесения весеннего удобрения из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) на минимум 25 л воды на 10 соток.

Подкормку вводят через почву или же листья.

Третий раз по желанию после завязи плодов производят листовую подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на минимум 25 л воды на 10 соток.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ЯВЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ ЗА 20-30 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИСТОВУЮ ПОДКОРМКУ РАСТЕНИЙ ИЗ РАСЧЕТА 122 МЛ DISCO НА МИНИМУМ 25 Л ВОДЫ НА 10 СОТОК

ВИНОГРАД

Первая, почвенная подкормка осуществляется после введения удобрения в почву осенью из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на минимум 12.5 л воды на 10 соток.

Рекомендуется применять (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) три или четыре раза в сезон.

Вторичное применение осуществляется сразу же после внесения весеннего удобрения из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на минимум 25 л воды на 10 соток. Подкормку вводят через почву или же листья.

Третий раз по желанию после завязи плодов производят листовую подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на минимум 25 л воды на 10 соток.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ЯВЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ВИНОГРАДНЫХ ЛОЗАХ ЗА 10 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИСТОВУЮ ПОДКОРМКУ РАСТЕНИЙ ИЗ РАСЧЕТА 122 МЛ DISCO НА МИНИМУМ 25 Л ВОДЫ НА 10 СОТОК

БАНАН

Перед периодом цветения осуществляется почвенная подкормка растения посредством введения 125 мл продукта(diCO-B5A-ANATOLiA-ry) , разведенного минимум 12.5 л воды, из расчета на 10 соток.

Через 30 дней осуществляется вторичная почвенная подкормка.

Третью подкормку проводят через 30 дней. Рекомендуется применять(diCO-B5A-ANATOLiA-ry) сразу же после использования химического удобрения.

ЧАЙ

Одновременно с применением тройного суперфосфата вводят в почву продукт diCO – B5A – ANATOLiA-ry из расчета 125 мл на минимум 12.5 л воды, на 10 соток.

Когда начнут образовываться побеги рекомендуется осуществить листовую подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry), разведенного минимум 25 л воды, на 10 соток

После каждого срезания листьев рекомендуется листовая подкормка продуктом (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на минимум 25 л воды на 10 соток.

ФУНДУК

Почвенная подкормка осуществляется осенью и весной совместно с введением в почву удобрения. Продукт применяется из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry), разведенного 12.5 л воды, на 10 соток.

По желанию, сразу же после появления плодов можно осуществить листовую подкормку из расчета 125 мл (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) на 25 л воды...

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Листовая подкормка: 8 гр (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) разводят в 5 л воды, полученной смесью опрыскивают листья. Данная процедура осуществляется раз в 20 дней.

Периодически рекомендуется чередовать почвенную и листовую подкормку.

Производство цветов для срезания: В дополнение к нормально программе использования химического удобрения в почву вводят 125 мл , раз (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) бавленного минимум 25 л воды, на 10 соток.

Необходимо применять продукт на протяжении всего сезона с интервалом в 20-30 дней. Возможно 3-х или 4-х кратное применение подкормки, при этом необходимо разделить 20-дневную дозу продукта на 3 или 4 раза. Желательно не прибегать к листовой подкормке. При вынужденных же обстоятельствах необходимо увеличить в 3 или 4 раза количество воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 – Применение продукта (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) должно осуществляться не ранее чем за 5 дней до использования сельскохозяйственных лекарственных препаратов, или же через 5 дней после того.

2- Исследования показали, что продукт (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) обогащает запасы макро и микроэлементов, чем значительно повышает продуктивность растений.

3- Вышеприведенное количество воды является минимальны(diCO-B5A-ANATOLiA-ry)м. является жидким органическим удобрением, более продуктивно действующим при взаимодействии с водой. Превышение используемых норм воды не окажут негативного влияния на действие (diCO-B5A-ANATOLiA-ry).

Как сбалансировать продукт (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) с удобрением химического синтетического и другого состава?

Очень важно сделать анализ почвы, включающий следовые элементы. Рекомендуем осуществлять подкормку растительных культур с целью пополнения потребностей в макро и микро элементах. Продукт (diCO-B5A-ANATOLiA-ry) не в состоянии создать элементы, которых нет в почве. Подкармливая растения вы можете добавлять в почву повторно используемые азот, фосфор, калий, органоминеральные удобрения, сгоревшие удобрения животного происхождения и микроэлементы. Использование химических синтетических удобрений и микроэлементов должно осуществляться в зависимости от потребностей почвы по результатам анализов.

Как осуществить очистку поливной системы?

Перед применением (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) поливная система и оборудование должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных лекарственных препаратов. Данные остатки могут снизить эффективность продукта (diCO-B5A-ANATOLIA-ry), а вы не получите ожидаемых результатов!

На что необходимо обратить внимание?

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Идеальные условия хранения достигаются при температуре 4-14 °C

СОВЕТЫ

*Результаты исследований показали, что применение продукта (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) в качестве подкормки сразу же после введения макро и микро следовых элементов, значительно повышает продуктивность растений.

*В таблице использования указано минимальное количество воды. (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) является эффективным жидким органическим удобрением, прекрасно взаимодействующим с водой. Превышение используемых норм воды не окажут негативного влияния на действие (diCO-B5A-ANATOLIA-ry). Тщательно взболтайте бутылку, содержащую (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) и воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить вдали от детей и пищевых продуктов
- Категорически запрещено использование совместно с такими лекарственными препаратами как İsektisit, Fungusit, Herbisit Akarisit. Применение (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) допустимо за 5 дней перед и через 5 дней после использования данной группы веществ.
- Имеет смысл использовать данный продукт минимум через 5 дней после применения сельскохозяйственных препаратов.
- Обязательно необходимо очистить цистерны под (diCO-B5A-ANATOLIA-ry) от остатков сельскохозяйственных лекарственных препаратов.
- Наша фирма не несет ответственности за неправильное использование продукта.
- Применяйте в ранние утренние часы.